Reunião Geral Projeto GESVESPA

Principais Resultados Ação 3 e Ação 4

Escola Superior Agrária – Instituto Politécnico de Viana do Castelo

REFOIOS – PONTE DE LIMA, PORTUGAL

15 De dezembro de 2017

Instituto Politécnico
de Viana do Castelo

Instituto Politécnico
de Viana do Castelo

ATIVIDADES AÇÃO 3

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	PONTO DE SITUAÇÃO
Aquisição de informação sobre a espécie e os meios de luta na europa.	Executado
Levantamento de equipamentos de destruição e controlo.	Recolha de Informação já obtida em 60 % da amostra (21 equipas de destruição já responderam à metodologia e equipamento utilizado.
Captura com armadilhas. Avaliação da eficácia e especificidade de diferentes tipos de armadilhas comerciais e artesanais e diferentes tipos de iscos atrativos.	O IPVC realizou, segundo orientação metodológica do INIAV 5 ensaios (5 semanas cada) para avaliação da eficácia, de armadilhas e iscos. A análise dos resultados, concretamente as contagens e principais conclusões serão apresentados pelo INIAV.
Avaliação e adequação dos protocolos para a destruição dos ninhos.	Inquéritos realizados, análise e conclusão já elaborada.
Metodologia de controlo – captura em apiários com armadilhas seletivas.	Executado

Instituto Politécnico
de Viana do Castelo

ATIVIDADES AÇÃO 4

ATIVIDADES PREVISTAS	PONTO DE SITUAÇÃO
Alterações no comportamento de recolção das colónias de abelhas	Em desenvolvimento, aguarda instalação do equipamento experimental adquirido recentemente pelo INIAV.
Identificação de comportamentos defensivos.	Existe já identificação visual e relatos deste tipo de comportamento, aguarda validação através de captura de imagem.
Transmissão de doenças das abelhas. Comportamento de predação.	Não foi possível validar este objetivo/desenvolver esta atividade por falta de recursos técnicos, nomeadamente instrumentos de observação e metodologias de introdução.

Instituto Politécnico
de Viana do Castelo

ATIVIDADES AÇÃO 4

ATIVIDADES PREVISTAS	PONTO DE SITUAÇÃO
Estudos em apiários com sistemas de vídeo e de monitorização da atividade das colónias.	Por executar, atrasos na aquisição do equipamento de monitorização.
Realização de inquéritos aos apicultores e gestores do território.	Executado com uma amostra de 30 apicultores e empresas apícolas apenas na CIM AltoMinho. Aguardamos inquéritos enviados pela FNAP.
Estudo e aplicação das metodologias de avaliação de riscos e pressões sobre a biodiversidade e os ecossistemas e serviços de bens públicos por ela suportados, em particular orientada para a redução da pressão da <i>Vespa velutina</i> sobre áreas sensíveis nomeadamente da rede Natura 2000, localizados na região Norte (NUTS II).	Em desenvolvimento.

RESULTADOS Informação sobre a espécie

Origem: Espécie Autóctone do Norte da Índia e China, introduzida na Europa em 2004

Nome científico: *Vespa velutina*

Habitat: Em ninhos construídos maioritariamente em amieiros, eucaliptos e carvalhos, encontrados em alturas entre os 2-30mts (80% dos casos- Dado AAG). Registos de construções de ninhos primários em edifícios e no solo.

Características Fisiológicas: dorso e tórax negro, patas amarelas, linha fina amarela entre o 1º e 2º segmento abdominal, 4º segmento abdominal amarelo terminação escura; tamanho entre os 3-3,5 cm.

https://www.researchgate.net/figure/258769112_fig2_Figure-2-Individuals-belonging-to-the-different-castes-in-Vespa-velutina-C-K-Monceau

Instituto Politécnico
de Viana do Castelo

RESULTADOS Organismos Competências instrumentos de coordenação na europa

e

PORTUGAL

Existência de um plano de ação, com objetivos, ações de formação, sensibilização e delegação de competências.

Principais entidades responsáveis:

DGAV - Coordenação

ICNF – Gestão da Plataforma [SOS Vespa](#)

INIAV – Suporte Científico

Câmaras Municipais, bombeiros, Proteção Civil - Destruição

PRINCIPAL MEIO DE DESTRUIÇÃO
INCINERAÇÃO

ESPANHA

Existência de um “plan de Control da Vespa velutina”, ações de formação, sensibilização e delegação de competências.

Principais entidades responsáveis:

Consellería do Medio Rural -Xunta -
Coordenação

<http://www.controlvelutina.com/>

Servizos Veterinarios - Divulgação

Protecion Civil- Destruição

PRINCIPAL MEIO DE DESTRUIÇÃO
LUTA QUÍMICA

FRANÇA

Existência de um plano de ação
[DGAL/SDSPA/N2013-8082](#)

Principais entidades responsáveis:

L'OVS animal (Organisme à Vocation Sanitaire - Coordenação e avaliação eficaz)

Museum National d'Histoire Naturel e o ITSAP (instituto da Abelha) – Suporte Científico e elaboração protocolos de controlo

Préfecture, Camaras e empresas registadas – Destruição

<http://frelonasiatique.mnhn.fr/signaler/>

PRINCIPAL MEIO DE DESTRUIÇÃO
LUTA QUÍMICA

Instituto Politécnico
de Viana do Castelo

RESULTADOS Organismos Competências e instrumentos de coordenação na europa

ITÁLIA

Principais entidades responsáveis:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Coordenação
Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura– Suporte Científico
Protezione civile e vigili del fuoco- Destruição
<http://www.stopvelutina.it/dove/>
**PRINCIPAL MEIO DE DESTRUIÇÃO
LUTA QUÍMICA e INCINERAÇÃO**

UK

Detetado um ninho em Woolacombe, Devon e outro Gloucestershire
NNSS já criou plataforma de comunicação:
http://www.brc.ac.uk/risc/alert.php?species=asian_hornet

BÉLGICA

Avistamentos de ninhos na província de Wallonie. Plataforma de comunicação já criada
<http://biodiversite.wallonie.be/fr/le-frelon-asiatique.html?IDC=5999>

SUIÇA

Relatos de ninhos a 27/04/2017 em Kanton Jura, Folhetos já elaborados com canal de comunicação
info@apiservice.ch

Instituto Politécnico
de Viana do Castelo

RESULTADOS Levantamento das técnicas de controlo.

O Controlo atual fundamenta-se em duas vertentes:

1. Captura seletiva/programada de rainhas em determinada época do ano
2. Captura não seletiva de obreiras
3. Deteção e eliminação precoce do ninho

Instituto Politécnico
de Viana do Castelo

RESULTADOS Principais conclusões sobre as técnicas de controlo.

1. CAPTURA PROGRAMADA

Uso de armadilhas deve ser realizado com precaução devido à não existência no mercado, até ao momento, de armadilhas totalmente seletivas colocando em risco outras espécies.

EPOCA DE COLOCAÇÃO:

Capturas de primavera: momento em que as fundadoras terminam a hibernação abandonam ninho primário para iniciar um novo ciclo anual.

Capturas de outono: momento em que as futuras rainhas, recentemente fecundadas, abandonam o ninho secundário, antes da hibernação, momento prévio ao início do novo ciclo anual.

<http://www.kmonceau.fr/wp-content/uploads/2011/08/Monceau-et-al.-Review-Vespa-velutina.pdf>

Instituto Politécnico
de Viana do Castelo

RESULTADOS Principais conclusões sobre as técnicas de controlo.

2. CAPTURA NÃO PROGRAMADA

Uso de armadilhas maioritariamente junto aos apiários numa proporção de 1 armadilha para 5 colmeias.

Substituição quinzenal do isco. Captura massiva entre junho e Outubro.

Objetivo: Tentativa da diminuição da predação.

Efeito não avaliado: Possibilidade de estimular a postura das rainhas para compensar a captura.

Solução/Isco maioritariamente utilizado: Groselha, Vinho e Cerveja

Photos from Gesvespa Project

RESULTADOS Principais métodos de Eliminação de ninhos em Portugal e na Europa

3.TÉCNICAS DE ELIMINAÇÃO DE NINHOS

Técnicas Homologadas		Técnicas não Homologadas	
Mecânicas	Químicas	Mecânicas	Químicas
Incineração com recurso a gás e pértiga	Injeção de inseticida com recurso a pértiga (Permetrina, Cipermetrina, Deltametrina e SO ₂)	Destruição com recurso a explosivo (petardo, eletrocutado com pértiga) Destruição com recurso a arma de fogo.	Inoculação de exemplares de vespa através de isco impregnado com inseticida sistémico não homologado (ex. Fipronil)
Asfixia por tamponamento da entrada com espuma de poliuretano e embalamento			
Congelação (depende dimensão)- Maioritariamente utilizada em ninhos primários

Photo - A. LEGRAND

Instituto Politécnico
de Viana do Castelo

RESULTADOS - Principais métodos de Eliminação de ninhos em Portugal e na Europa

<https://www.google.pt/search?q=Queima+ninhos+vespa+asiatica>

Photos from Agrolouro SL

Instituto Politécnico
de Viana do Castelo

RESULTADOS - Novos métodos de Eliminação de ninhos em Portugal e na Europa

<https://www.youtube.com/watch?v=EW0-GBQKjyE>

https://www.youtube.com/watch?v=_ngb_En01Jw

<https://www.youtube.com/watch?v=zhduRizYehc>

https://www.youtube.com/watch?v=4gBWH_xn94M

Instituto Politécnico
de Viana do Castelo

Avaliação e adequação dos protocolos para a destruição dos ninhos.

Principais resultados inquiridos às equipas de destruição

Amostra	21	Municípios
Universo	35	Municípios

60%

Vale do Cavado - N Ninhos

Vale do Tâmega - N Ninhos

Instituto Politécnico
de Viana do Castelo

Avaliação e adequação dos protocolos para a destruição dos ninhos.

Principais resultados inquiridos às equipas de destruição

Instituto Politécnico
de Viana do Castelo

Avaliação e adequação dos protocolos para a destruição dos ninhos.

Principais resultados inquiridos às equipas de destruição

Instituto Politécnico
de Viana do Castelo

Avaliação e adequação dos protocolos para a destruição dos ninhos.

Principais resultados inquiridos às equipas de destruição

Todas as intervenções da equipa de destruição são comunicadas através da plataforma SOS Vespa?

Avaliação e adequação dos protocolos para a destruição dos ninhos.

Principais resultados inquiridos às equipas de destruição

Os equipamentos de proteção individual são adequados?

A destruição ocorre num determinado horário do dia? Qual?

Método de destruição mais utilizado

Qual a técnica de destruição mais utilizada

Instituto Politécnico de Viana do Castelo

Avaliação e adequação dos protocolos para a destruição dos ninhos.

Principais resultados inquiridos às equipas de destruição

Por favor estime um custo para a entidade, incluindo, matérias primas utilizadas, recursos humanos afetos, custos com deslocação e outros por ninho destruído

Instituto Politécnico
de Viana do Castelo

Avaliação e adequação dos protocolos para a destruição dos ninhos.

Principais resultados inquiridos equipas às de destruição

Por favor estime o Nº de horas médio afetas à destruição por ninho. Considere todo o procedimento desde a comunicação e confirmação da existência até à plena destruição.

Instituto Politécnico
de Viana do Castelo

Avaliação e adequação dos protocolos para a destruição dos ninhos.

Principais resultados inquiridos às equipas de destruição

Considera que os equipamentos adquiridos reduziram o tempo médio para destruição?

Valor médio de todo o universo de respostas

Instituto Politécnico
de Viana do Castelo

Avaliação e adequação dos protocolos para a destruição dos ninhos.

Principais resultados inquiridos às equipas de destruição

Relativamente ao impacto social, concretamente face ao medo da população, esta tendência tem diminuído?

Tem desenvolvido algum instrumento (folheto, brochura, vídeo demonstração) sobre o combate, a espécie ou informação em geral?

Quais as temáticas e instrumentos que considera mais importantes para divulgação?

Instituto Politécnico
de Viana do Castelo

Avaliação e adequação dos protocolos para a destruição dos ninhos.

Principais resultados inquiridos às equipas de destruição

A equipa de destruição ou entidade desenvolve algum tipo de análise dos fatores de combate

Quais os fatores de combate mais importantes

Instituto Politécnico
de Viana do Castelo

Avaliação e adequação dos protocolos para a destruição dos ninhos.

SÍNTESE:

Do universo de respostas obtido até ao momento relata-se **11502 ninhos destruídos**. A NUT com mais ninhos destruídos é o AltoMinho, seguido do Ave, Tâmega e Cavado.

A Plataforma SOSvespa não parece ser o instrumento de integração mais importante para o registo e destruição dos ninhos, uma vez que dos **60% das equipas que responderam ao inquérito apenas, 37% utilizam integralmente este sistema de aviso**.

O método de destruição maioritariamente utilizado pelas equipas é a **incineração** com recurso a gás (71%), apesar de 67% referir que utiliza outra técnica dependendo da necessidade. Destacar que **74% das equipas relata episódios de reincidência da infestação**, existindo notória sensibilidade para o período de destruição mais efetivo, **coincidindo o método com o período. Incineração-Noite /L. Química – Dia**.

De forma geral as equipas relatam que os **EPI's são adequados** (76%/24%) e que o equipamento adquirido pelo Gesvespa é mais eficiente (71%/29%). Relativamente ao **custos de destruição e ao pessoal envolvido não houve grandes diferenças face ao equipamento adquirido pelo projeto**. Pré-projecto 63% (25€-100€) Pós-projecto(71% 25€-100€).

Instituto Politécnico
de Viana do Castelo

Avaliação e adequação dos protocolos para a destruição dos ninhos.

SÍNTESE:

Relativamente ao **tempo médio para destruição**, **45% das equipas**, relata um período de **2-5h** e **32% 1-2h**. 65% das equipas assume que os equipamentos fornecidos pelo Gesvespa reduziram o tempo médio de destruição, apesar de número médio de pessoas necessárias para destruição antes e depois ser praticamente idêntico. – 2 pessoas.

Relativamente ao impacto nas populações, concretamente face à perigosidade da espécie, apenas 48% das equipas relata existir alguma diminuição. É importante que o **projeto reforce os meios divulgação e os instrumentos**, já que **71% das equipas refere não desenvolver qualquer instrumento sobre o combate, espécie ou informação em geral**.

As equipas assumem como instrumentos e **temáticas mais importantes** para a sensibilização: **o período de combate; as técnicas de captura por armadilhas e iscos mais eficientes e a elaboração e distribuição através de folhetos informativos**.

Denota-se que esta atividade de destruição é uma atividade algo forçada/imposta, sendo apenas **62% das equipas as que desenvolvem qualquer tipo de registo, priorizando, fatores como a localização do ninho; os meios envolvidos; km's percorridos e a técnica de destruição utilizada**.

Instituto Politécnico
de Viana do Castelo

Avaliação do Impacto na Apicultura

Principais Resultados e conclusões dos inquéritos aos Apicultores

Avaliação do Impacto na Apicultura

Principais Resultados e conclusões dos inquéritos aos Apicultores

Percentagem de apicultores que avistou ninhos de vespa de Vespa velutina

Percentagem de apicultores que destruíram ninhos de Vespa velutina

Percentagem de apicultores que viram as autoridades a destruir ninhos de Vespa velutina

Instituto Politécnico
de Viana do Castelo

Avaliação do Impacto na Apicultura

Principais Resultados e conclusões dos inquéritos aos Apicultores

2015: 52%

2016: 63%

Avaliação do Impacto na Apicultura

Principais Resultados e conclusões dos inquéritos aos Apicultores

Grau de Satisfação dos apicultores perante a destruição pelas autarquias

Grau de Satisfação dos apicultores perante a destruição demais entidades

Avaliação do Impacto na Apicultura

Principais Resultados e conclusões dos inquéritos aos Apicultores

Avaliação do Impacto na Apicultura

Principais Resultados e conclusões dos inquéritos aos Apicultores

Instituto Politécnico
de Viana do Castelo

Avaliação do Impacto na Apicultura

Principais Resultados e conclusões dos inquéritos aos Apicultores

Quanto tempo dedica no controlo e destruição da Vespa Velutina sempre que se desloca a um apiário?

Instituto Politécnico
de Viana do Castelo

Avaliação e adequação dos protocolos para a destruição dos ninhos.

SÍNTESE:

- O Universo de apicultores apesar de pequeno 30 inquiridos até ao momento, é representativo do panorama nacional PAN2017-2019.
- 77% dos apicultores amadores vs 74% a nível nacional
- 19% semiprofissionais vs 16% a nível nacional
- 4% profissionais vs 10% a nível nacional
- 89% dos apicultores avistou pelo menos 1 ninho de vespa e 22% avistou > 10 ninhos
- São elementos importantes no combate, sensibilização e formação, já que apesar do amadorismo dos inquiridos 62% já destruiu e 75% viu/acompanhou a destruição pelas autoridades.
- Em 2015 - 52% dos apicultores admitiu perdas de efetivo, em 2016 foram 63%

De forma geral apresentam um grau de **satisfação positivo com a atuação das entidades**, apenas 18% não estão satisfeitos. É **importante analisar com cuidado este grau de satisfação, devido ao público inquirido, uma vez que se somarmos a população profissional e semiprofissional é de 23%**.

No futuro iremos correlacionar o grau de satisfação dos inquiridos cuja a fonte de rendimento é predominantemente da apicultura e perceber se o combate é satisfatório do ponto de vista das perdas do efetivo.

Instituto Politécnico
de Viana do Castelo

Avaliação e adequação dos protocolos para a destruição dos ninhos.

SÍNTESE:

A população inquirida está consciente de que os **métodos utilizados não controlarão o crescimento da invasora** 56% vs 44%.

O **método destruição que mais virem aplicar foi a incineração**, seguida da luta química, sendo os 2 métodos que apresentam maior eficácia no controlo da população.

Esta população de inquiridos opta por uma captura não programada e não seletiva ao longo de todo o ano. É importante consciencializa-los para as melhores épocas, uma vez que 90% dos inquiridos reconhece utilizar armadilhas e despender tempo na “caça” a esta espécie (85% dos inquiridos dedicam pelo menos 15 minutos em cada visita ao apiário para o combate à vespa velutina).

Instituto Politécnico
de Viana do Castelo

Conclusão – Principais considerações

- Continuar a **desenvolver investigação do ciclo biológico e do comportamento da vespa** no território nacional.
- Estudar **novos métodos de controlo mais eficazes e seletivos**, como o **uso de feromonas nas armadilhas** ou de **inibidores específicos para as vespas, a luta biológica**, ou outros **métodos de destruição seletiva**.
- Utilização de outros métodos de deteção de ninhos: **infravermelhos, câmaras térmicas, uso de Dornes por teledeteção e radares harmónicos**.
- Valorização dos métodos de eliminação: biocidas de ação prolongada, vapor de água, incineração;
- Desenvolver acordos com universidades para investigação de determinadas áreas, **criação de redes de conhecimento** e contacto constante com outros grupos de trabalho e de investigação.
- **Melhorar a divulgação da informação** já existente de forma a que chegue a toda a sociedade civil.
- Dotar os municípios “tampão” e as equipas de destruição de meios financeiros, que permitam fazer do combate **uma ação do seu plano de atividade anual**.
- Manter um plano de formação atualizado, quer relativamente à identificação, quer aos meios de controlo e novas soluções.
- Fornecer gratuitamente aos apicultores e á população em geral, armadilhas, calendários de colocação das mesmas e receitas de iscos.

Instituto Politécnico
de Viana do Castelo

Conclusão – Principais considerações

- **Utilizar as Juntas de Freguesia, como plataformas de proximidade**, para o registo dos avistamentos na plataforma SOSVespa.
- **Melhorar a Plataforma SOS VESPA**, no interface dos Gestores Locais e agentes da proteção civil:
 - Criar um separador para registo de armadilhas, permitir inserir campanhas de “armadilhagem”.
 - Permitir imprimir da plataforma um ficheiro .doc com toda a informação referente ao ninho registado, ao local onde se encontra “espécie de árvore”, de forma a que as equipas possam programar saídas, meios e destruições em “rota”.
- Atualizar o plano de Ação e os materiais divulgativos existentes:
 - Como identificar a espécie; quais os procedimentos de comunicação de ninhos; **locais onde o registo pode ser feito para as populações rurais; procedimentos de segurança** afim de se evitarem ataques massivos pela espécie, cada vez mais frequentes durante a realização de trabalhos agrícolas.
- **Elaborar materiais divulgativos** e de formação **específicos para os agentes envolvidos** na coordenação das ações acima descritas.
- **Mais ações de formação para as equipas** sobre: **Fenologia** da espécie (Diferenciação de Machos VS Obreiras VS Rainhas VS Fundadoras); **técnicas de destruição de ninhos em segurança; Operação e manutenção de ferramentas e equipamentos.**

OBRIGADO

anapaula@esa.ipvc.pt

samueljacome@ipvc.pt

josepires@esa.ipvc.pt

Instituto Politécnico
de Viana do Castelo